

วัคซีน ป้องกันโรคไอกรน



ชนิดไร้เซลล์ (Pertussis (acellular) : aP) ในหญิงตั้งครรภ์

โรคไอกรน คืออะไร?

โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อทางเดินหายใจ



ไอรุนแรง ในเด็กเล็กอาจมีอาการไอเป็นชุด ๆ ทำให้หายใจไม่ทันจนเกิดภาวะขาดออกซิเจน

อาจหยุดหายใจจนเสียชีวิตได้

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเพื่อให้ร่างกายของหญิงตั้งครรภ์สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน แล้วส่งต่อภูมิคุ้มกันจากแม่ไปยังทารก เพื่อให้ทารกที่คลอดออกมามีภูมิคุ้มกัน

ป้องกัน
ทารกป่วยจากโรคได้ **93%**

ลดการป่วย
รุนแรง/การนอนรพ.ได้ **90.5%**



บุคคลที่ไม่ควรได้รับวัคซีน!!!

- เคยมีปฏิกิริยารุนแรง หรือ ปัญหาอื่นที่รุนแรงจากวัคซีนนี้มาก่อน
- มีภาวะผิดปกติทางสมอง หรือชักซึ่งยังควบคุมไม่ได้
- มีไข้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีน

- ปวดบวม แดง บริเวณที่ฉีด และอาจทำให้มีปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อยล้าและปวดข้อ
- อาการแพ้รุนแรง ได้แก่ มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อนแรง

สามารถเข้ารับบริการได้อย่างไร?

หญิงตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน



ฉีดวัคซีนอย่างไร?

แนะนำให้วัคซีนไอกรน (aP) 1 เข็ม ทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ 20 - 32 สัปดาห์

ข้อควรปฏิบัติ หลังรับวัคซีน

- ✚ พักสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน ณ สถานที่รับบริการและควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน
- ✚ หากมีอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีน ควรแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนรับวัคซีนครั้งต่อไป
- ✚ หากปวด บวม บริเวณที่ฉีด ให้ประคบด้วยผ้าเย็น และหากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้
- ✚ หากรับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้รุนแรง ควรรีบพบแพทย์
- ✚ ควรรับวัคซีนตามกำหนดและเก็บสมุดบันทึกการรับวัคซีนไว้ตลอดไป
- ✚ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข



ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค